

## Учим ребенка произносить шипящие звуки.

К шипящим звукам относятся звуки Ш, Ж, Щ, Ч. Чаще всего проблемы возникают с произношением звуков Ж и Ш. Для работы вам понадобится зеркало. Все упражнения вы должны предварительно проработать самостоятельно и будьте готовы терпеливо демонстрировать их ребенку бесчисленное количество раз.

**Первое упражнение** направлено на то, чтобы расслабить язык, «распластать» его. Слегка приоткрыть рот, положить язык на нижние зубы и пошлепывать верхними зубами по языку, тихонько проговаривая «та-та-та». Взрослый может при этом считать до десяти и обратно. Затем язычок расслабляем и даем спокойно полежать. Повторяем упражнение, пошлепывая по языку верхней губой, произносим при этом «пя-пя-пя».

**Второе упражнение** направлено на отработку подъема кончика языка вверх. Для упражнения вам понадобится жевательная конфета или ириска. Это сделает упражнение эффективным и послужит стимулом для ребенка. Ребенок приоткрывает рот примерно на 2-3 см. кончик языка высовывает, распластывает и кладет на нижнюю губу. Вы кладете на язык маленький, тоненький кусочек конфеты. Ребенок должен приклеить конфетку к верхнему небу сразу за зубами. Следите, чтобы ребенок двигал только языком, а не челюстью.

**Третье упражнение** направлено на формирование навыка выпускать воздушную струю посередине языка. Кладем на стол кусочек ватки. Ребенок приоткрывает рот в улыбке, высовывает кончик языка, распластывает, как в предыдущем упражнении, и кладет на нижнюю губу. Задача- сдуть ватку на другой край стола, произнося подобие звука Ф. надувать щеки нельзя.

**Четвертое и самое распространенное упражнение** по обучению шипящим звукам. Ребенок приоткрывает рот в улыбке, кончик языка кладет на нижнюю губу так, чтобы края были прижаты, а по середине образовался желобок. На нос ребенку кладем кусочек ватки. Носом делаем вдох, а ртом- резкий выдох. Если упражнение выполнено правильно, то ватка полетит вверх.

**Упражнение пятое(самое важное)**. учимся произносить звук Ш и Ж. произносим слог СА, с каждым разом передвигая кончик языка все ближе к альвеолам. Согласный звук при это меняется от С к Ш.